

## *Caulophilus latinasus* (Say) Широкохоботный амбарный долгоносик

**Распространение:** страны Северной и Южной Америки, многие европейские государства, ряд африканских и азиатских стран.

**Повреждаемые растения:** рис, зерно кукурузы, другие зернопродукты.

**Симптомы повреждений:** характерные повреждения зерна (погрызы), загрязнение зернопродуктов экскрементами и другими отходами жизнедеятельности вредителей.

**Пути распространения:** с семенами и зерном повреждаемых растений.

**Методы выявления и идентификации:** визуальный досмотр, флотация, просеивание.

От близких видов *Caulophilus latinasus* отличается рядом морфологических признаков, заключающихся в особенностях строения головотрубки и ног, характере пунктировки надкрылий и переднеспинки и т.д.

**Ссылки на основные источники информации по выявлению и идентификации:**

1. Негрובה Е.А., Негрובה О.П., Негрובה С.О. Определитель семейств личинок жесткокрылых (Coleoptera) Европейской части России: учебное пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. 66 с.

2. Определитель насекомых европейской части СССР в пяти томах. Т. 2. Жесткокрылые и веерокрылые. Серия «Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР». Вып. 89. М.-Л.: Наука, 1965. 668 с.

3. Соколов Е.А. Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Оренбург: Печатный дом «Димур», 2004. 104 с.

4. Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала / Сост. Я.Б. Мордкович и Е.А. Соколов. М.: Колос, 1999. 384 с.





Имаго широкохоботного амбарного долгоносика (<http://bugguide.net>)