

## Восточная каштановая орехотворка

*Dryocosmus kuriphilus* Yas.

### Страны распространения и возможного заноса:

Китай, Япония, Республика Корея, США, Италия, Франция, Словения, Хорватия, Нидерланды, Швейцария.

### Характерная подкарантинная продукция и пути распространения:


Возможен занос с саженцами следующих видов каштанов: посевной (*C. sativa*), японский (*C. crenata*), американский (*C. dentata*), китайский (*C. mollissima*), Сегю (*C. seguinii*), *C. ozarkensis*.

### Симптомы повреждений и методы диагностики:

Повреждает цветочные почки каштана настоящего, которые выглядят как аномальные разрастания тканей почки, листьев и стебля разной формы, размеров и окраски. Галлы с личинками внутри зеленые и красно-зеленые. После вылета самки галл чернеет. Галлы хорошо заметны на ветвях саженцев каштана посевного и других *Castanea*.



Восточная каштановая орехотворка (*D. kuriphilus*) (<http://wiki.bugwood.org>)



Самка *D. kuriphilus*, откладывающая яйца в цветочную почку  
(<http://www.ecocentrica.info>)



Яйцо *D. kuriphilus* в цветочной почке  
(<http://photos.eppo.org>)



Личинки *D. kuriphilus* в цветочной почке  
(<http://photos.eppo.org>)



Куколка *D. kuriphilus*  
(<https://gd.eppo.int>)



Галлы *D. kuriphilus* на листе каштана посевного (<http://www.regione.piemonte.it>)



Галлы *D. kuriphilus* на листе каштана посевного (<https://archives.eppo.int>)